

# Novizin<sup>®</sup> immun

24 Lutschtabletten

je 1000 mg

PZN: 11313966

**Novizin<sup>®</sup> immun** ist ein diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät). **Novizin<sup>®</sup> immun** zur diätetischen Behandlung von rezidivierenden (wiederkehrenden) und chronischen Infekten des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes immungeschwächter Patienten.

**Novizin<sup>®</sup> immun** ist ein orales Probiotikum verwendbar ab 3 Jahren.

**Novizin<sup>®</sup> immun** ist zur Behandlung von wiederkehrenden Infektionen des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes.

**Novizin<sup>®</sup> immun** zur Einnahme während einer Virusinfektion des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes immungeschwächter Patienten.

**Novizin<sup>®</sup> immun** zur Einnahme nach einer Mandelentzündung (nach einer abgeschlossenen Behandlung mit Antibiotika).

## Wichtige Hinweise

- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Ergänzende bilanzierte Diät
- Trocken und lichtgeschützt bei Raumtemperatur lagern.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die einzigartige Formulierung von Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) ist das weltweit erste, orale Probiotikum, das das Merkmal hat Lantibiotika zu produzieren und das Wachstum von pathogenen Erregern, wie z.B. Streptococcus pyogenes und Streptococcus pneumoniae zu hemmen. Diese Krankheitserreger sind verantwortlich für die Infektionen des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes.

Die Wirksamkeit, sowie die grundlegenden Eigenschaften und Merkmale des probiotischen Stammes Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) wird durch zahlreiche wissenschaftliche Studien belegt.

Bei **Novizin<sup>®</sup> immun** sind keine bekannten Nebenwirkungen beschrieben.

## Zusammensetzung

Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12) 50 mg pro Lutschtablette

	pro Tagesportion	pro 100g
<b>Brennwert / Energie</b>	<b>17 kJ / (4 kcal)</b>	<b>1.699 kJ (400 kcal)</b>
Fett	0,02 g	1,50 g
davon gesättigte Fettsäuren	0,02 g	1,50 g
Kohlenhydrate	0,96 g	96,00 g
davon Zucker	0,64 g	63,50 g
Eiweiß	0,01 g	0,72 g
Salz	< 0,01 g	0,01 g

**Zutaten:** Streptococcus salivarius K12 (BLIS K12), Fructose, Erdbeeraroma, Maltodextrin, Siliciumdioxid, Magnesiumsalz der Stearinsäure.

## Empfohlene Tagesdosis

1 Lutschtablette vor dem Zubettgehen, nach dem Zähneputzen einnehmen.

Die Lutschtablette langsam ca. 5 Minuten bis zum vollständigen Auflösen im Mund zergehen lassen (in die Backe legen).

Um einen möglichst langen Kontakt der aktiven Substanz mit der Schleimhaut zu garantieren, sollte die Lutschtablette nicht zerkaut oder geschluckt werden.

Unmittelbar nach der Einnahme sollte nicht getrunken werden.

Das Produkt sollte nicht gleichzeitig mit antibakteriell wirkenden Mundspülungen angewendet werden.

Sollte im Falle eines individuellen Bedarfs die Einnahme von 2 Lutschtabletten täglich durch einen Arzt empfohlen werden:

1 Lutschtablette morgens nach dem Frühstück und Zähneputzen einnehmen, 1 Lutschtablette abends vor dem Zubettgehen, nach dem Zähneputzen einnehmen.

## Zur Behandlung von wiederkehrenden Infektionen des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes

1 Lutschtablette täglich über einen Zeitraum von 3 Monaten.

## Während einer Virusinfektion des Hals-Nasen-Ohren-Rachenraumes

1 Lutschtablette täglich über einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen.

## Nach einer Mandelentzündung (nach einer abgeschlossenen Behandlung mit Antibiotika)

1 Lutschtablette täglich über einen Zeitraum von 3 Monaten.

**medAgil**  
Gesundheitsgesellschaft mbH

medAgil Gesundheitsgesellschaft mbH  
Anton-Sommer-Str. 15  
D-88046 Friedrichshafen  
Tel.: +49 (0)7541 9789780  
www.medagil.de

[www.novizin.de](http://www.novizin.de)